

POS SCA ST+ Grand Est

Enregistrement ECG 18 dérivations

VVP à gauche en évitant si possible le poignet
Antalgiques morphiniques (si EVA > 6 et après administration des AAP)
Recherche contre-indication aux thérapeutiques

Bilan CRRA 15 : estimation heure d'arrivée en salle de KT (ROR)

SCA ST+ > 3H (Douleur-ECG)

SCA ST+ ≤ 3H (Douleur-ECG)

Délai ECG – Angio < 120 min
(Transport < 60 min)

Délai ECG – Angio > 120 min
(Transport ≥ 60 min)
Sauf si CI, état de choc ou risque hémorragique élevé

ANGIOPLASTIE PRIMAIRE

THROMBOLYSE PRÉHOSPITALIÈRE

ASPÉGIC® 250 mg IVD
+ BRILIQUE® 2 cp
+ LOVÉNOX® 0,5mg/kg IVD
OU Héparine Non Fractionnée 70 UI/kg puis 15 UI/kg/h

CAS PARTICULIERS

Patient sous AVK ou ADO

ASPÉGIC® 250 mg IVD

Patient sous P2Y12

Age du patient ≤ 75 ans

METALYSE® 30 à 50 mg IVD
+ ASPÉGIC® 250 mg IVD
+ PLAVIX® 300 mg
+ LOVÉNOX® 30mg IVD puis 1mg/kg SC

*CI: Insuffisance Rénale
-> HNF 70 UI/kg puis 15 UI/kg/h*

Age du patient > 75 ans

METALYSE® 15 à 25 mg IVD
+ ASPÉGIC® 250 mg IVD
+ PLAVIX® 75 mg
+ LOVÉNOX® 0,75mg/kg en SC

*CI: Insuffisance Rénale
-> HNF 70 UI/kg puis 15 UI/kg/h*